RÉUNION ANNUELLE
DU GROUPE FRANÇAIS
DE NEURO-GASTROENTÉROLOGIE

26 & 27 JUIN
2025
VILLAGE BY CA
ROUEN

Impact de l'insomnie sur le syndrome de l'intestin irritable

Eline Albert

*Stage Master 2, Recherche Clinique
Service d'Hépatogastroentérologie – CHU de Rouen*

Nantes
Université

GFNG
Groupe Français de
Neuro-Gastroentérologie

37.6% des patients SII estiment
avoir des troubles du sommeil à
l'échelle mondiale.

Qu'en est-il de l'insomnie ?

Prévalence : touche **10%** de la population mondiale

Symptômes associés à l'insomnie

Prévalence : touche **10%** de la population mondiale

Symptômes associés à l'insomnie

→ Origine multifactorielle

Facteurs psychologiques :
Stress chronique, événements
traumatiques, anxiété, dépression

Etude IISII : Quel est l'impact de l'insomnie chez les patients SII?

Hypothèse : Les patients SII + Insomnie (S3I) développent des symptômes intestinaux et extra-intestinaux plus sévères que les patients ayant un SII seul.

Score ISI

Index de sévérité de l'insomnie

Cohorte OTFI (“Observatoire des Troubles Fonctionnels Intestinaux”)

Formation des groupes S2I/S3I

Groupe S3I:

- Augmentation du risque d'avoir plusieurs comorbidités digestives et extra digestives associées.
- Augmentation significative de la sévérité des différents symptômes.

Variables	SII (S2I)	SII + Insomnie (S3I)	Pvalue
Démographique	n= 430	n= 270	
Fumeurs (%)	69 (16.05)	67 (24.81)	0.004
Consomme de l'alcool (%)	193 (44.88)	103 (38.15)	0.08
Pathologies digestives	n= 430	n= 270	
Dyspepsie Fonctionnelle (%)	232 (53.95)	194 (71.85)	<0.001
EPS (%)	168 (39.07)	156 (57.78)	<0.001
PDS (%)	163 (37.91)	147 (54.55)	<0.001
RGO (%)	94 (21.86)	81 (30.0)	0.015
Pathologies extra-digestives	n= 430	n= 270	
Anxiété (%)	146 (20.86)	170 (24.29)	<0.001
Dépression (%)	77 (11)	104 (14.86)	<0.001
Endométriose (%)	55 (16.32)	51 (23.94)	0.028
Fibromyalgie (%)	43 (10.0)	44 (16.3)	0.014
Fatigue Chronique (%)	241 (56.05)	203 (75.19)	<0.001
Questionnaire Scores	n= 430	n= 270	
Francis (symptômes digestifs)	238.8 ± 104.74	280.16 ± 96.54	<0.001
IBSQOL (qualité de vie)	61.60 ± 22.33	49.49 ± 23.20	<0.001
Pagi-Sym (symptômes digestifs supérieurs)	n=404	n=256	
	43.32 ± 17.04	53.37 ± 17.14	<0.001
PHQ-15 (symptômes somatiques)	11.67 ± 4.61	16.26 ± 4.89	<0.001
PSQI (qualité du sommeil)	7.22 ± 2.97	11.96 ± 3.11	<0.001

D'où provient la présence d'insomnie chez les patients SII ?

Independent Variable	Insomnie N=700 Nagelkerke R Square= 0.204		
	P-value	OR	95% CI
Fumeurs	0,19	1,317	0,872-1,987
Francis	0,074	1,002	1,000-1,003
Anxiété	<0,001	2,614	1,858-3,677
Dépression	0,004	1,76	1,196-2,591
Dyspepsie fonctionnelle	0,004	1,693	1,179-2,431
RGO	0,355	1,198	0,816-1,759
Fibromyalgie	0,256	1,337	0,810-2,206
Endométriose	0,101	1,472	0,928-2,337
Fatigue Chronique	0,006	1,683	1,164-2,434
Constant	<0,001	0,094	

Le modèle explique 20.4% de la variance de présence de l'insomnie

➔ L'anxiété multiplie par 2.6 fois le risque d'insomnie

➔ La dépression multiplie par 1.8 fois le risque d'insomnie

➔ La DF et la fatigue chronique multiplient par 1.7 fois le risque d'insomnie

Régression logistique

OR : Odds ratio (représente l'effet de la variable sur la probabilité d'être insomniaque) ; 95% CI : intervalle de confiance de l'OR.

Francis : Sévérité des symptômes intestinaux liés au SII ; RGO: reflux gastro-œsophagien.

Prévalence de l'insomnie
dans le SII → **38,6%**

Rôle important de l'**anxiété**
et de la **dépression** dans
la présence d'insomnie.

L'insomnie des patients
SII **n'est pas**
expliquée par leurs
symptômes digestifs.

Plus un patient SII
possède de comorbidités
(DF, fatigue chronique),
plus il a de risque d'être
insomniaque

RÉUNION ANNUELLE
DU GROUPE FRANÇAIS
DE NEURO-GASTROENTÉROLOGIE

26 & 27 JUIN
2025
VILLAGE BY CA
ROUEN

**Merci pour votre
attention !**

Je remercie toutes les personnes m'ayant accompagné tout au long de mon stage et le Comité d'Organisation du congrès !

Nantes
Université

GFNG
Groupe Français de
Neuro-Gastroentérologie